

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------------|------|----------------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 防除用紙番号 | すいか | 試交210号 津軽産 | ほ場番号 | ① 2 3 4 5 6 | 生産者番号 | 1126 | 生産者氏名 | 神成誠治 | 収穫開始日 | 8/6 |
| | | | | | | | | | 収穫終了日 | / |

4.防除関係 (使用した薬剤名の使用月日欄・使用濃度(希釈倍数)欄・散布量(散布水量)欄にそれぞれ記入する。)
 ※防除用紙についてはほ場・品種・収穫時期が異なる場合は別用紙に記入する。ただし、品種・収穫時期が同じで、農薬散布を常に同一日に散布できる場合は同じ防除用紙に記入してもよい。(防除用紙が複数枚になる場合は作型の早い順に用紙番号と総枚数を記入する)

| 用途 | 使用農薬 | 使用基準 | | | | 使用月日・使用濃度(希釈倍数)および散布量(散布水量) | | | | | | | | |
|----|---------------|------|-------|-----------|----------------|-----------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 薬剤名 | 収穫前日数 | 使用回数 | 希釈倍数 または使用量 | 使用液量・使用量 (10aあたり) | 1回目 | | 2回目 | | 3回目 | | 4回目 | |
| | | | | | | | 月/日 | 濃度 | 散布量 | 月/日 | 濃度 | 散布量 | 月/日 | 濃度 |
| 殺 | ダコニール 1000 | 3日 | 5回 | 700~1000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | ジマンダイセン水和剤 | 7日 | 7回 | 400~600 | 100~300ℓ | 6/28 400倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| | ベルコート水和剤 | 前日 | 4回 | 1000 | 150~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | トップジンM水和剤 | 前日 | 5回 | 1500~2000 | 100~300ℓ | 6/28 1500倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| | ベンレート 水和剤 | 前日 | 5回 | 2000~3000 | 100~300ℓ | 8/3 2000倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| | アミスター 20フロアブル | 前日 | 4回 | 2000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | オーソサイド水和剤80 | 14日 | 5回 | 400~800 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | リドミルゴールドMZ | 7日 | 3回 | 1000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | Zボルドー水和剤 | - | - | 500~800 | 100~300ℓ | 8/3 500倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| | 277AWDC9 | 前日 | 3回 | 1500~2000 | 100~300ℓ | 7/12 1500倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| 殺 | ダントツ 水溶剤 | 前日 | 3回 | 2000~4000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | フェニックス顆粒水和剤 | 前日 | 2回 | 2000~4000 | 100~300ℓ | 7/12 2000倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| | マラソン 乳剤 | 前日 | 6回 | 1000~3000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | テルスター水和剤 | 前日 | 4回 | 1000 | 150~300ℓ | 8/3 1000倍 | 1000ℓ | / | | / | | / | | |
| | トレボン 乳剤 | 3日 | 3回 | 1000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | ベストガード水溶剤 | 7日 | 3回 | 1000~2000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | ダニサラバフロアブル | 前日 | 2回 | 1000 | 100~350ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | コロマイト乳剤 | 7日 | 2回 | 1000 | 100~300ℓ | / | | / | | / | | / | | |
| | | | | | | / | | / | | / | | / | | |
| | | | | | | / | | / | | / | | / | | |

* つがるブランドすいかは農薬成分使用回数が10回以内です。 * 上記農薬は2016/05/25に登録確認しました。
 ★農薬の安全使用について
 ①必ず登録のある農薬(農薬は、随時新規登録、登録失効等の変更があります最新の登録状況を確認してください)を使用しましょう。
 ②農薬の使用に当たっては、必ず農薬の使用基準(適用作物、希釈倍率、収穫前日数、使用回数、使用液量)を確認して使用しましょう。
 ③薬剤名や剤形が違って成分が同じ農薬があります、同一成分での総使用回数制限がありますので、必ず農薬のラベルで確認して使用しましょう。
 ④散布時は、他の作物や収穫期の異なるすいか・メロン、隣接ほ場への飛散(ドリフト)に充分注意し、散布後は散布機具の洗浄を徹底しましょう。