

防除用紙番号	すいか	品種名	ほ場番号	生産者番号	生産者氏名	収穫開始日	収穫終了日
/	津軽シャオ	①②③ 456	1163	越後 幸子	8/11	/	/

4. 防除関係 (使用した薬剤名の使用月日欄・使用濃度(希釈倍数)欄・散布量(散布水量)欄にそれぞれ記入する。)
 ※防除用紙についてはほ場・品種・収穫時期が異なる場合は別用紙に記入する。ただし、品種・収穫時期が同じで、農業散布を常に同一日に散布できる場合は同じ防除用紙に記入してもよい。(防除用紙が複数枚になる場合は作型の早い順に用紙番号と総枚数を記入する)

用途	薬剤名	収穫前日数	使用回数	希釈倍数 または使用量	使用液量・使用量 (10aあたり)	使用月日・使用濃度(希釈倍数)および散布量(散布水量)							
						1回目		2回目		3回目		4回目	
						月/日	濃度	月/日	濃度	月/日	濃度	月/日	濃度
殺	ダコニール 1000	3日	5回	700~1000	100~300ℓ	6/22 1000倍	800ℓ	7/7 1000倍	800ℓ	7/16 1000倍	800ℓ	7/26 1000倍	800ℓ
	ジマンダイセン水和剤	7日	7回	400~600	100~300ℓ	/	/	6/29 500倍	800ℓ	/	/	/	/
	ベルグート水和剤	前日	4回	1000	150~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
	トップジンM水和剤	前日	5回	1500~2000	100~300ℓ	7/21 1500倍	800ℓ	7/31 1500倍	700ℓ	/	/	/	/
	ベンレート 水和剤	前日	5回	2000~3000	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
	アミスター 20フロアブル	前日	4回	2000	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
	オーソサイド水和剤80	14日	5回	400~800	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
	リドミルゴールドMZ	7日	3回	1000	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
	Zボルドー水和剤	-	-	500~800	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
	殺	ダントツ 水溶剤	前日	3回	2000~4000	100~300ℓ	6/22 2000倍	800ℓ	6/29 4000倍	800ℓ	7/16 2000倍	800ℓ	/
フェニックス顆粒水和剤		前日	2回	2000~4000	100~300ℓ	7/21 2000倍	800ℓ	/	/	/	/	/	/
マラソン 乳剤		前日	6回	1000~3000	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
テルスター水和剤		前日	4回	1000	150~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
トレボン 乳剤		3日	3回	1000	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
ベストガード水溶剤		7日	3回	1000~2000	100~300ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
ダニサラバフロアブル		前日	2回	1000	100~350ℓ	/	/	/	/	/	/	/	/
コロマイト乳剤		7日	2回	1000	100~300ℓ	7/31 1000倍	700ℓ	/	/	/	/	/	/
ケイカルス		前日	1回	2000		7/7 2000倍	800ℓ	/	/	/	/	/	/
コルト				4000		7/26 4000倍	800ℓ	/	/	/	/	/	/

* つがるブランドすいかは農業成分使用回数が10回以内です。 * 上記農業は2016/05/25に登録確認しました。
 ★農業の安全使用について
 ①必ず登録のある農業(農業は、随時新規登録、登録失効等の変更があります最新の登録状況を確認してください)を使用しましょう。
 ②農業の使用に当たっては、必ず農業の使用基準(適用作物、希釈倍率、収穫前日数、使用回数、使用液量)を確認して使用しましょう。
 ③薬剤名や剤形が違って成分が同じ農業があります。同一成分での総使用回数制限がありますので、必ず農業のラベルで確認して使用しましょう。
 ④散布時は、他の作物や収穫期の異なるすいか・メロン、隣接ほ場への飛散(ドリフト)に充分注意し、散布後は散布機具の洗浄を徹底しましょう。